

## Der Krankenhaus-Vergleich: Gallenblasen-Entfernung

Krankenhaus (1)	Patienten pro Jahr (2)	Anteil der Hochrisikopatienten (3)	Alter der Patienten (4)	BQS-Qualitätsdaten				Dokumentationsquote der BQS-Fälle (9)	Zertifikat (10)	Empfehlung der Ärzte
				Komplikationen durch die Operation <b>5</b>	Wiederholungs-OP wg. Komplikationen <b>6</b>	Todesfälle infolge des Eingriffs <b>7</b>	Nicht leitliniengerechte Therapie-Wahl <b>8</b>			
				Bundesdurchschnitt: 3,95%	1,79%	0,44%	1,81%			
				Referenzbereich: 0 bis 9	0 bis 2	0	0 bis 5,8			
				Qualitätsaussage: Je niedriger, desto besser	Je niedriger, desto besser	Je niedriger, desto besser	Je niedriger, desto besser			
Bundeswehrkrankenhaus	71	31,0%	55,0	0,0% ✓	1,5% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	100,0%	KTQ	1,3%
Charité Benjamin Franklin	124	38,0%	60	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100,0%	-	0,7%
Charité Mitte	117	20,0%	54	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100,0%	-	2,1%
Charité Virchow-Klinikum	162	40,0%	57	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100,0%	-	1,3%
Dominikus Krankenhaus	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100,0%	KTQ	1,2%
DRK Kliniken Köpenick	344	16,6%	61	2,3% ✓	0,9% ✓	0,9%	1,5% ✓	100,0%	JCI	2,7%
DRK Kliniken Mark Brandenburg	155	33,5%	58	1,9% ✓	2,0% ✓	0,0% ✓	0,6% ✓	100,0%	JCI	1,1%
DRK Kliniken Westend	456	12,1%	58,5	1,5% ✓	0,4% ✓	K 0,4%	K 3,7% ✓	100,0%	JCI	7,8%
Ev. Elisabeth Klinik	136	28,6%	55	K 2,9% ✓	K 0,8% ✓	K 0,0% ✓	K 1,4% ✓	100,0%	KTQ	2,6%
Ev. Krankenh. Königin Elisabeth Herzberge	222	21,2%	61	2,3% ✓	1,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	100,0%	KTQ	3,1%
Ev. Krankenhaus Hubertus	53	9,4%	61	9,4%	1,9% ✓	0,0% ✓	1,9% ✓	92,98%	KTQ	1,5%
Ev. Martin-Luther-Krankenhaus	140	21,4%	59	4,3% ✓	0,8% ✓	0,0% ✓	1,4% ✓	100,0%	KTQ	3,0%
Ev. Waldkrankenhaus Spandau	210	18,6%	51	1,9% ✓	1,0% ✓	0,0% ✓	1,9% ✓	95,02%	KTQ	1,6%
Franziskus-Krankenhaus	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	100,0%	-	0,2%
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe	60	13,3%	60	0,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	K 6,7%	90,9%	-	1,5%
Helios Klinikum Berlin-Buch	236	24,6%	54,5	4,2% ✓	K 3,4%	0,0% ✓	2,1% ✓	100,0%	-	2,3%
Helios Klinikum Emil von Behring	265	18,9%	59	5,7% ✓	2,4%	0,0% ✓	1,5% ✓	100,0%	-	7,0%
Jüdisches Krankenhaus	124	26,6%	55,5	K 0,8% ✓	K 0,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	99,2%	KTQ/ISO	0,9%
Klinik Hygiea	26	0,0%	58,5	0,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	100,0%	-	0,0%
Klinik für MIC (Minimal Inv. Chirurgie)	393	39,9%	55	0,0% ✓	0,5% ✓	0,0% ✓	k.A.	100,0%	-	6,0%
Krankenhaus Bethel Lichterfelde	80	55,0%	68	K 8,7% ✓	K 4,7%	K 1,4%	1,2% ✓	100,0%	-	1,7%
Krankenhaus Waldfriede	104	18,3%	62	1,0% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	3,8% ✓	94,54%	KTQ	2,4%
Maria Heimsuch. Caritas-Klinik Pankow	153	18,3%	61	3,3% ✓	0,7% ✓	0,0% ✓	K 11,1%	100,0%	ISO	2,1%
Park-Klinik Weißensee	284	13,7%	52,5	6,3% ✓	1,9% ✓	0,4%	3,5% ✓	100,0%	KTQ	5,2%
Sana Klinikum Lichtenberg	314	26,1%	61	4,8% ✓	1,1% ✓	K 1,3%	1,3% ✓	95,0%	KTQ	6,6%
Schloßpark-Klinik	253	16,6%	58	3,2% ✓	2,0% ✓	0,0% ✓	2,0% ✓	100,0%	KTQ	3,9%
St. Gertrauden-Krankenhaus	137	10,9%	63	2,2% ✓	0,0% ✓	0,7%	0,0% ✓	100,0%	KTQ	2,9%
St. Hedwig-Kliniken (Mitte)	171	26,9%	61	5,8% ✓	1,7% ✓	0,6%	K 8,8%	100,0%	EFQM	2,0%
St. Joseph-Krankenhaus	282	19,1%	55	1,1% ✓	0,8% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	100,0%	-	4,4%
St. Marien-Krankenhaus Berlin	166	39,2%	60	6,0% ✓	2,0% ✓	K 0,6%	1,8% ✓	99,0%	KTQ/PCC	1,5%
Unfallkrankenhaus Berlin	203	22,2%	51	4,4% ✓	0,7% ✓	0,0% ✓	1,5% ✓	100,0%	-	2,2%
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum	176	22,2%	60	4,0% ✓	2,6%	0,6%	0,6% ✓	100,0%	-	2,4%
Vivantes Humboldt-Klinikum	345	20,0%	61	5,2% ✓	2,3%	0,3%	2,3% ✓	100,0%	-	2,6%
Vivantes Klinikum Am Urban	204	15,2%	50	6,4% ✓	3,6%	0,5%	1,0% ✓	100,0%	-	1,5%
Vivantes Klinikum Hellersdorf	171	25,7%	53	2,9% ✓	2,4%	0,6%	0,0% ✓	100,0%	-	1,3%
Vivantes Klinikum im Friedrichshain	196	21,4%	59	8,2% ✓	K 4,9%	0,0% ✓	2,0% ✓	100,0%	-	3,0%
Vivantes Klinikum Neukölln	257	16,3%	60	1,2% ✓	0,0% ✓	0,0% ✓	1,2% ✓	100,0%	-	2,2%
Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg	145	26,9%	56	6,9% ✓	4,5%	0,7%	1,4% ✓	100,0%	-	1,9%
Vivantes Klinikum Spandau	198	30,3%	63	4,5% ✓	1,7% ✓	0,5%	0,5% ✓	100,0%	-	1,3%
Vivantes Wenckebach-Klinikum	99	26,3%	59	6,1% ✓	4,4%	1,0%	1,0% ✓	93,4%	-	1,1%

k.A. = Klinik hat die Daten nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Entfällt = Keine Patienten, auf die der Indikator zutrifft. K = Dieser Wert wird von der Klinik kommentiert. ✓ = Wert liegt innerhalb des Referenzbereiches für gute Qualität. Quelle: Iges, Tsp/Bartel

(1) = Alle Berliner Krankenhäuser, in denen diese Behandlung vorgenommen wird (mind. 10 Fälle im Jahr 2004). (2) = Anzahl der Behandlungen laut BQS-Jahresauswertung 2004. (3) = Anteil von Patienten der höchsten Risikoklassen (ASA 3 bis 5). (4) = Median des Alters aller Patienten. Die Indikatoren: 5 = Anteil aller Patienten, denen die Gallenblase operativ entfernt wurde, die mindestens eine für den Eingriff typische behandlungspflichtige Komplikation erlitten. Solche Komplikationen sind zum Beispiel Verletzungen des Gallenganges oder der lebersorgenden Blutgefäße. 6 = Anteil an allen Patienten, deren operative Gallenblasenentfernung minimalinvasiv begonnen wurde, bei denen wegen Komplikationen ein erneuter Eingriff nötig wurde. Typische Gründe dafür sind nicht entfernte Gallengangsteine, Gallengangsverletzungen, Blutungen oder Entzündungen. Bei minimalinvasiv (schlüssellochchirurgisch)

durchgeführten Gallenblasenentfernungen sind Reparatureingriffe seltener erforderlich als bei Operationen durch die geöffnete Bauchdecke. Das liegt aber auch daran, dass solche „offen“ genannten Operationen besonders oft an Patienten mit schwer entzündeten Gallenblasen vorgenommen werden, die anfälliger für Komplikationen sind. 7 = Anteil aller Geringrisikopatienten (Risikoklassen ASA 1 bis 3), denen die Gallenblase operativ entfernt wurde, die infolge der Operation verstarben. Solche Todesfolgen sind bei dieser Operation selten: in Deutschland sterben nach Angaben der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) durchschnittlich zwischen 0,1 und 0,2 Prozent der Patienten. Laut BQS-Vorgaben muss jeder einzelne Todesfall im Strukturierten Dialog untersucht werden („sentinel event“). 8 = Anteil aller Patienten, denen die Gallenblase entfernt wurde, bei denen die Bedingungen der Leitlinie zur Be-

handlung von Gallensteinen erfüllt waren. Nach dieser Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten sollte folgendes für die operative Entfernung der Gallenblase erfüllt sein: ein Gallensteinleiden, das Schmerzen auslöst, oder eine Gallenblasenentzündung. (9) = Anzahl der Behandlungsfälle an allen BQS-pflichtigen Leistungen, deren Qualitätsdaten korrekt gemeldet wurden. (10) = Art der erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierungsverfahren für innerbetriebliche Prozesse, die eine gleichbleibend hohe Qualität der Behandlung sichern sollen. Empfehlungen (11) = Anzahl der Nennungen als empfehlenswerte Klinik (nur Berlin) für diese Behandlung, umgerechnet in Prozent. Die ausführliche Leseanleitung zur Tabelle mit Erläuterungen zu allen Angaben finden Sie im Internet unter: www.tagesspiegel.de/kliniktest